

新潟市の予防接種実施方法

新潟市の予防接種は、全て**委託医療機関での個別接種**です。接種日や接種時間などは、あらかじめ委託医療機関にお問い合わせください。なお、接種日に新潟市に住民登録（住民票）のある方が新潟市での定期予防接種の対象です。定期予防接種は**接種対象年齢内**であれば**接種費用は無料**です。

| 予 防 接 種 名 | ワクチンの種類 | 望 ま し い 接 種 年 齢 | 接種対象年齢 | 接 種 間 隔 | 備 考 | 接種回数 |
|---|---------|---|---|--|---|--------|
| ヒ ブ (インフルエンザa型) | 不活化 | [初回] 生後2か月以上 7か月未満に開始 [追加] 初回終了後 7月～13月の間 | 生後2か月以上 5歳未満 | [初回] 4～8週(27～56日)の間隔を おいて3回接種します。 [追加] 初回終了後、7月～13月の間 に1回接種します。 | 接種開始時期によって接種回数 が変わるので注意しまし ょう(次ページ参照)。 | 4 |
| 小児用肺炎球菌 | 不活化 | [初回] 生後2か月以上 7か月未満に開始 [追加] 生後12か月～ 15か月の間 (初回終了後60日 以上の間隔を おいて) | 生後2か月以上 5歳未満 | [初回] 27日以上の間隔を おいて3回接種 します。(1歳に なるまでに初 回3回を完了 する) [追加] 初回終了後60 日以上の間隔 を おいて1歳以 降に1回接種 します。(標準 として生後12 か月～15か 月の間) | 接種開始時期によって接種回数 が変わるので注意しまし ょう(次ページ参照)。 | 4 |
| B 型 肝 炎 | 不活化 | 生後2か月～ 生後9か月まで | 出生後から 1歳未満 | 27日以上の間隔 で2回、さら に1回目の接 種から139日 経過した後に 1回接種しま す。 | | 3 |
| ロ タ ウ イ ル ス | 生 | [初回] 生後2か月～ 生後14週6日 まで | 生後6週から 24週(ロタリ ックスの場合) 生後6週から 32週(ロタテ ックの場合) | 27日以上の間 隔を おいて2回接 種 しま す。 27日以上の間 隔を おいて3回接 種 しま す。 | 令和2年10月1 日からの定期 予防接種で、 経口投与(飲む) ワクチンです。 | 2 3 |
| 四 種 混 合 D P T - I P V [ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ] | 不活化 | [1期初回] 生後3か月以 上 1歳未満 [1期追加] 2歳半未満 (1期初回完了 後 1年～1年半) | 生後3か月以 上 7歳半未満 | [1期初回] 3～8週(20～ 56日)の間隔 を おいて3回接 種 しま す。 [1期追加] 1期初回終了 後6か月以上 の 間隔を おいて1回接 種 しま す。 (標準として 1 期初回終了 後 1年～1年半) | | 4 |
| B C G | 生 | 生後5か月以 上 8か月未満 | 出生後から 1歳未満 | 1回接種しま す。 | 接種期間が短 いので注意し ま し よ う。 | 1 |
| 麻 し ん 風 し ん 混 合 ワ ク チ ン (MRワクチン) | 生 | [1期] 1歳以上 1歳3か月未 満 [2期] 小学校就学前 の 1年間 | 1歳以上2歳 未 満 5歳以上7歳 未 満 の 者 で、 小 学 校 就 学 前 の 1 年 間 (いわゆる年 長 児) | 麻しん風しん 混 合 ワ ク チ ン を 1 回 接 種 し ま す。 麻しん風しん 混 合 ワ ク チ ン を 1 回 接 種 し ま す。 | 1歳以降なる べく 早 期 に 受 け ま し よ う。 なるべく小学 校 入 学 前 の 「 就 学 時 の 健 康 診 断 」 ま で に 受 け ま し よ う。 | 2 |
| 水 痘 (水ぼうそう) | 生 | [初回] 1歳～ 1歳3か月未 満 [追加] 初回終了後6 月 ～ 12月の間隔 を おいて | 1歳以上3歳 未 満 | 3月以上の間 隔を おいて2回接 種 し ま す。 | 1歳以降なる べく 早 期 に 受 け ま し よ う。 | 2 |
| 日 本 脳 炎 | 不活化 | [1期初回] 3歳 [1期追加] 4歳 [2期] 9歳 | 生後6か月以 上 7歳半未満 9歳以上13歳 未 満 | [1期初回] 1～4週(6～ 28日)の間隔 を おいて2回接 種 し ま す。 [1期追加] 1 期初回終了 後 お お む ね 1 年 お い て 1 回 接 種 し ま す。 [2期] 1 期 終 了 後 4～5年間 隔 で 1 回 追 加 接 種 し ま す。 | 3歳未満で接 種 す る 場 合、 接 種 量 が 異 な り ま す。  | 4 |
| 二 種 混 合 D T [ジフテリア 破傷風] | 不活化 | 11歳 | 11歳以上13歳 未 満 | 1回接種しま す。 | | 1 |

上記は令和3年4月現在の小学生までを対象とした予防接種の情報です。最新の情報は、市ホームページをご覧ください。接種方法、接種時期については、かかりつけ医とご相談のうえ接種してください。

異なる種類のワクチンを接種する場合の接種間隔



| 注射生ワクチン | |
|---------|---------------------------------|
| 定期接種 | MR (麻しん風しん混合) BCG 水痘 (水ぼうそう) |
| 任意接種 | おたふくかぜ |

| 経口生ワクチン | |
|---------|--------|
| 定期接種 | ロタウイルス |

| 不活化ワクチン | |
|---------|---|
| 定期接種 | 四種混合 (DPT-IPV) 二種混合 (DT) 日本脳炎 ヒブ (インフルエンザ菌b型) 小児用肺炎球菌 ヒトパピローマウイルス (HPV) B型肝炎 |
| 任意接種 | インフルエンザ |

接種した翌日から数えて
27日以上あけましょう

制限はありません

制限はありません

制限はありません

次の予防接種

注射生ワクチン

経口生ワクチン
・不活化ワクチン

注射生ワクチン

経口生ワクチン
・不活化ワクチン

注射生ワクチン

経口生ワクチン
・不活化ワクチン

病気が治ってから予防接種を受ける場合の接種間隔



病気の種類により、回復後、予防接種を受けるまでに一定の間隔が必要となる場合があります。下の説明を参照し、主治医に相談しましょう。

| |
|--|
| 麻しん (はしか) |
| 風しん、水痘 (水ぼうそう)、おたふくかぜ など重症感染症にかかった場合 |
| 突発性発疹、手足口病、ヘルパンギーナ、 伝染性紅斑、感染性胃腸炎、風邪など比較的 軽微に経過した感染症にかかった場合 |

治ってから
4週間程度あけましょう

治ってから
2～4週間程度あけましょう

治ってから
1～2週間程度あけましょう

次の予防接種

生ワクチン

不活化ワクチン

予防接種に行く前に・・・

- ☆生後1か月の健診を受けたら、「かかりつけ医」を決めましょう。
- ☆お子さんの体調のよい時に受けましょう。
- ☆お子さんの日頃の状態をよく知っている保護者が同伴しましょう。
- ☆母子健康手帳に予防接種を受けた記録をしますので、忘れずに持って行きましょう。
- ☆予約する前に、対象年齢、接種間隔を確認しましょう。
- ☆副反応については「予防接種と子どもの健康」をお読みください。また、厚生労働省のホームページでも確認することができます。(「厚生労働省 予防接種情報」で検索)



新潟市
食育・花育推進キャラクター
まいちゃん

生後2か月の誕生日はワクチンデビュー！

予防接種の目的はワクチンで防げる病気の予防です。病気の予防に適切な時期に必要な予防接種を受けましょう。ワクチンの種類が増えているので、スタートは早めに！

「ロタウイルスワクチン」は生後6週から接種可能ですので、かかりつけ医に相談しましょう。