

予防接種ワクチンと一般的な接種間隔

	ワクチンの種類	接種スケジュール	O週 1週間 2週間 3週間 4週間 5週間 6週間 7週間 8週間 ~6か月~ ~12か月~ ~18か月~	有効期間
A型肝炎 初回2回 追加1回	不活化	初回:2~4週の間隔で2回接種 追加:初回接種後24週を経過した後 対象者:1歳以上	初回 <input type="text"/> 2回目 <input type="text"/> <input type="text"/> 追加 <input type="text"/>	5~10年
B型肝炎 3回	不活化	4週の間隔で2回 更に20~24週を経過した後に1回接種 対象者:2ヶ月以上	初回 <input type="text"/> <input type="text"/> 2回目 <input type="text"/> <input type="text"/> 追加 <input type="text"/>	10年以上
破傷風 初回2回 追加1回	不活化	初回:3~8週の間隔で2回接種 追加:初回免疫後6か月以降 (標準として12~18か月)接種	初回 <input type="text"/> <input type="text"/> 2回目 <input type="text"/> <input type="text"/> 追加 <input type="text"/> ※破傷風ワクチンは1968年(昭和43年)から始まった3種混合ワクチンに含まれている。12歳で2種混合ワクチンを受けていれば、20代前半位までは免疫があるので、接種は不要。それを過ぎたら、1回の追加接種で10年間は無効な免疫が付く	10年間
日本脳炎 初回2回 追加1回	不活化	初回:1~4週の間隔で2回接種 追加:初回免疫後概ね1年を経過した後 大人は通常1回	初回 <input type="text"/> <input type="text"/> 2回目 <input type="text"/> <input type="text"/> 追加 <input type="text"/> ※日本脳炎ワクチンは1954年(昭和29年)から導入された	4年間
ポリオ 基礎免疫 有1回 無3回	不活化	4週以上の間隔で3回接種	初回 <input type="text"/> <input type="text"/> 2回目 <input type="text"/> <input type="text"/> 3回目 <input type="text"/> ※基礎免疫【生(経口)ワクチン2回, 不活化ワクチン4回】 ※ポリオ生ワクチンは1961年(昭和36年)から導入された。(昭和50年~52年生まれの方:ポリオ抗体を持つ割合低い)	10年以上
狂犬病 3回	不活化	4週の間隔で2回 更に20~24週を経過した後に1回接種 対象者:2ヶ月以上	初回 <input type="text"/> <input type="text"/> 2回目 <input type="text"/> <input type="text"/> 追加 <input type="text"/>	3年以上

※違う種類のワクチンを接種する場合、不活化ワクチンは6日以上、生ワクチンは27日以上あけましょう。

