

呼吸器の機能障害の状況及び所見

（該当するものを○で囲むこと。）

1 身体計測

身長 cm 体重 kg

2 活動能力の程度

ア 激しい運動をした時だけ息切れがある。

イ 平坦な道を早足で歩く、又は緩やかな上り坂を歩くときに息切れがある。

ウ 息切れがあるので、同年代の人より平坦な道を歩くのが遅い、又は平坦な道を自分のペースで歩いている時、息切れのために立ち止まることがある。

エ 平坦な道を約 100m、又は数分歩くと息切れのために立ち止まる。

オ 息切れがひどく家から出られない、衣服の着替えをする時にも息切れがある。

3 胸部エックス線写真所見（ 年 月 日）

ア 胸 膜 癒 着 （有（高度・中等度・軽度）・無）

イ 気 腫 化 （有（高度・中等度・軽度）・無）

ウ 線 維 化 （有（高度・中等度・軽度）・無）

エ 不 透 明 肺 （有（高度・中等度・軽度）・無）

オ 胸 郭 変 形 （有（高度・中等度・軽度）・無）

カ 心縦隔の変形 （有（高度・中等度・軽度）・無）



4 換気機能（ 年 月 日）

ア 予測肺活量 □.□□ L （実測肺活量 □.□□ L）

イ 1 秒 量 □.□□ L （実測努力肺活量 □.□□ L）

ウ 予測肺活量 1 秒率 □□.□ % = $\left(\frac{\text{イ}}{\text{ア}} \times 100 \right)$

（アについては、下記の予測式を使用して算出すること。）

肺活量予測式（L）

男性 $0.045 \times \text{身長（cm）} - 0.023 \times \text{年齢（歳）} - 2.258$ 女性 $0.032 \times \text{身長（cm）} - 0.018 \times \text{年齢（歳）} - 1.178$

（予測式の適応年齢は男性 18－91 歳、女性 18－95 歳であり、適応年齢範囲外の症例には使用しないこと。）

5 動脈血ガス（ 年 月 日）

ア O₂ 分圧： □ □ □ . □ Torrイ CO₂ 分圧： □ □ □ . □ Torr

ウ pH : □ . □ □

エ 採血より分析までに時間を要した場合 □ □ 時間 □ □ 分

オ 耳朶血を用いた場合： []

6 その他の臨床所見