


ゴキブリ

ゴキブリは夜行性で暗くて狭い場所を好みます。このためトイレや台所，下水道などをすみかとし，たくさんの病原菌や病原体を体につけ，夜になると出てきて食品や食器の上を歩き回ります。


ここでは，ゴキブリの種類と防除・駆除方法について説明します。

ゴキブリの種類

| クロゴキブリ | ヤマトゴキブリ | チャバネゴキブリ |
|--|--|--|
|  |  |  |
| 成虫の体長 35mm 体色 光沢のある黒褐色 木造の日本家屋，コンクリート造りのアパートなどに多くいます。 | 成虫の体長 30mm 体色 黒褐色 木造の日本家屋に多く，屋外にも生息しています。 | 成虫の体長 10～15mm 体色 黄褐色 寒さに弱く暖房設備の整った飲食店，ホテルなどに多くいます。 |

ゴキブリの害

不潔感，不快感（黒光りした体や細くて長い触角）
悪臭，フンのシミ
異物混入（食品等に混入）
食品や本等をかじり，被害を与えます。
糞や死骸などがアレルギーになります。
感染症菌や食中毒菌を媒介します。



ゴキブリのすみか

- 暗い所（台所や風呂場周辺のすき間や裏側）
- 狭い所（台所や風呂場周辺のすき間や裏側）
- 温かい所（台所のレンジ周辺や冷蔵庫の裏付近，電化製品のすき間等）
- 湿っぽく水のある所（台所や風呂場周辺）
- 食べ物がある所（雑食性で動物質・植物質・腐敗物などなんでもたべます）

ゴキブリの防除に一年を通じて**台所のクリーン作戦**を行いましょう！

ゴキブリのエサ場や潜み場所はなんといっても台所です！
台所は常に整理整頓し，ゴミや食べ残しは片付け，清潔な環境にしましょう！

ゴキブリの駆除方法

| 出始め頃に先制駆除 | | | 最盛期に徹底駆除 | | 生き残りの越冬防止 | | |
|---|--|---|---|----|-----------|-----|-----|
| 春 | | | 夏 | | 秋～冬 | | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 先制攻撃 4月下旬 ～5月上旬 ≪方法≫ 直接噴霧 残留噴霧 粘着トラップ くん煙（ダニにも有効） | 生き残りとお卵対策 5月上旬 ～下旬 ≪方法≫ 直接噴霧 残留噴霧 粘着トラップ くん煙（ダニにも有効） | 最盛期対策 7月中旬 梅雨明け ≪方法≫ 直接噴霧 残留噴霧 粘着トラップ くん煙 毒餌 （各方法を併用） | 来年に備えて 9月中旬 ～10月中旬 ≪方法≫ 直接噴霧 残留噴霧 粘着トラップ （11月頃まで設置） | | | | |
| 活動前の対策が効果的です。早めの対応が必要です。 | 最盛期には，外からも侵入することがあります。 | 生き残りを越冬させないようにしましょう！ | | | | | |

ゴキブリが生息しにくい環境作りが大切です

隠れ場所をなくす


暗くて温かく、水と食料が豊富な所に潜んでいます。
台所や風呂場、電化製品のすき間等をチェックしてください。

エサをなくす

雑食性で、動物質・植物質・腐敗物などあらゆる物を食べます。
食料を密閉容器に保管することや、こまめに掃除することが重要です。

水をなくす

ゴキブリは水が無ければ生きていくことができません。
台所や風呂場などでよく見かけるのは、水を摂取するためです。



殺虫剤による駆除

(環境作りに加えて殺虫剤を使うと、より効果的です)

※薬剤を使用する際は、使用上の注意をよく読み、
子供の手の届かないところに保管しましょう。

エアゾールタイプ(スプレー式殺虫剤)

直接噴霧 最も一般的ですが、薬剤を直接かけないと効きません。
残留噴霧 { ゴキブリの通り道にあらかじめ薬剤を噴霧しておきます。
待ち伏せ型の薬剤で一度噴霧すれば効果が持続します。

くん煙タイプ

薬剤を部屋の中に充満させ、殺虫するタイプです。
卵が孵化する約1ヵ月後にもう一度使うと効果的です。

毒餌タイプ(ベイト剤)

毒餌をゴキブリに食べさせ殺虫するタイプです。
糞にも毒がまわり、その糞を食べた別のゴキブリも退治できます。

粘着トラップタイプ

粘着性の樹脂を使い、ゴキブリの通り道に設置し捕獲するタイプです。
殺虫成分は含まれていないため、完全駆除は望めません。

衛生害虫などの発生や駆除の方法でお困りのときは
下記にご相談ください。

新潟市保健所 環境衛生課 生活環境係
☎025-212-8269 (直通)